

Dermatix[®] - lokální silikonový gel pro prevenci jizev u čerstvě zhojených ran a redukcí vystouplých nevyzrálých jizev.

Co je Dermatix[®] gel?

Dermatix[®] je rychleschnoucí gel, který pomáhá udržet rovnováhu vlhkosti kůže. Je možné jej používat i při ošetření jizev vzniklých po operacích, popáleninách a jiných poraněních. Je prokázáno, že Dermatix[®] vyhlazuje, změkčuje a zjemňuje jizvy, potlačuje bolest, svědění a nepohodlí spojené s jizvami a rovněž zmenšuje jejich zarudnutí. Dermatix[®] gel se snadno používá na všechna místa kůže, včetně obličejů, kloubů a kožních záhybů. Po rychlém zaschnutí tvoří průhledný krycí "film".

Dermatix[®] je vyroben s využitím stejných základních dlouhořetězcových polymerů jako silikonové náplasti a je dodáván v tubě. Gel obsahující polysiloxan je dodáván v 15 g a 60 g tubách.*

K čemu se Dermatix[®] gel používá?

Dermatix[®] se používá k ošetření a prevenci keloidů a hypertrofických jizev (vzniklých jako následek běžných chirurgických zákroků, úrazů a popálenin), ideálně až poté, co je rána zhojena a její povrch je celistvý. Může se rovněž používat na vystouplé, zarudlé nevyzrálé jizvy, které se aktivně hojí často až po dobu dvou let od uzavření rány.

Jak se Dermatix[®] gel používá?

Odstříhnete špičku tuby. Ošetřovanou plochu umyjte a pečlivě osušte, protože Dermatix[®] se může používat pouze na čistou, suchou pokožku. Jemně vmasírujte malé množství gelu na povrch jizvy. V případě, že nanese příliš silnou vrstvu gelu, jemně setřete přebytečné množství kapesníčkem, abyste zamezili znečištění oděvu. Po zaschnutí můžete Dermatix[®] překrýt kosmetickými přípravky. Používejte ráno a večer minimálně po dobu dvou měsíců; problematické jizvy ovšem mohou vyžadovat dlouhodobější ošetření. Dermatix[®] se může používat i u dětí.


Kdy se Dermatix[®] gel nesmí používat?

- Dermatix[®] se nesmí používat na nezhojené otevřené rány.
- Dermatix[®] nesmí přijít do kontaktu se sliznicí, ani se nesmí nanášet příliš blízko očí.
- Dermatix[®] se nesmí nanášet na kůži ošetřenou jinými přípravky používanými k léčbě kůže bez porady s lékařem.

Může mít Dermatix[®] gel nežádoucí účinky?

Ve výjimečných případech může gel způsobit zarudnutí, bolest nebo podráždění pokožky. Objeví-li se některý z těchto příznaků nebo jiné nežádoucí účinky, poraďte se s lékárníkem nebo lékařem.

Jak se Dermatix[®] uchovává?

- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Uchovávejte při teplotě do 25°C a mimo dosah tepelných zdrojů.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (), uvedené na obalu.

Další informace

Více informací o Dermatixu[®] vám poskytne Váš lékárník nebo lékař.



Hanson Medical, Inc., Kingston, WA 98346, USA



Meda Pharmaceuticals Ltd., Takeley, CM22 6PU, Velká Británie

Distributor ve Velké Británii: Meda Pharmaceuticals Ltd,
Skyway House, Parsonage Road, Takeley, Bishop's Stortford, CM22 6PU

Distributor v České republice: MEDA Pharma s.r.o., Kodaňská 1446/41, 100 00 Praha 10



*V některých státech nemusí být na trhu všechna znázorněná balení

MEDA