

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ústní pastu SOLCOSERYL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěla.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je ústní pasta SOLCOSERYL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ústní pastu SOLCOSERYL používat
3. Jak se ústní pasta SOLCOSERYL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání ústní pasty SOLCOSERYL

SOLCOSERYL

orální pasta (ústní pasta)

- Léčivé látky: Vitulinae sanguinis fractio deproteinata 2,125 mg, lauromacrogolum 450 10,0 mg v 1 g ústní pasty.
- Pomocné látky: Propylparaben, methylparaben, menthol, želatina, pektin, polyethylen, tekutý parafin, sodná sůl karmelózy, silice máty peprné.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Německo

Balení

Hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty s 5 g ústní pasty.

1. CO JE ÚSTNÍ PASTA SOLCOSERYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SOLCOSERYL podporuje hojení poškozené tkáně v ústní dutině a jeho léčivá složka

lauromakrogol způsobuje povrchové znecitlivění a rychle utiší začínající a přetrvávající bolesti. Pasta vytváří díky svému přilnavému charakteru na ústní sliznici dlouhodobý ochranný povlak, který brání podráždění při jídle a pití. Bolest pomine za 1-3 minuty po nanesení pasty na bolestivé místo.

Ústní pasta SOLCOSERYL je indikována při léčbě:

- bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek, oparů na rtech, zánětů dásní (gingivitis, parodontitis);
- bolestivých otlaků způsobených umělým chrupem;
- bolestí dásní při prořezávání zubů (mléčné zuby, zuby moudrosti);
- jako ochranný obvaz po: odstranění zubního kamene, po operacích dásní, vytržení zubů; před nasazením dočasných zubních protéz a náhrad zubů, zánětu zubního lůžka - na doporučení lékaře.

Ústní pastu SOLCOSERYL mohou používat dospělí i děti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SOLCOSERYL POUŽÍVAT

Nepoužívejte SOLCOSERYL:

- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku.

Zvláštní opatření při použití ústní pasty SOLCOSERYL je zapotřebí:

Při zánětu musí být rána před použitím SOLCOSERYLu náležitě ošetřena.

Pasta nesmí být vtírána do hlubokých ran, které budou následně uzavřeny chirurgickým stehem.

Pokud trpíte ještě jiným onemocněním, máte alergii, užíváte ještě jiné léky, poraďte se o vhodnosti používání SOLCOSERYLu se svým lékařem.

Při akutních infekcích se doporučuje vypláchnout ústa desinfekčním roztokem.

Těhotenství a kojení

Pokud je žena těhotná, chce otěhotnět nebo kojí, měla by se o používání ústní pasty SOLCOSERYL poradit s lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Ústní pasta Solcoseryl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách ústní pasty SOLCOSERYL:

Obsahuje parabeny, které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Není doposud známé. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE ÚSTNÍ PASTA SOLCOSERYL POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, přibližně 1/2 cm ústní pasty SOLCOSERYL se 3-5x denně nanáší v tenké vrstvě na postižené místo. Použití se doporučuje zvláště před spaním. Pastu nemasírujte.

Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo doporučené lékařem.

Doba léčení trvá obvykle několik dní.

Nedojde-li k ústupu obtíží během 3-5 dnů léčby nebo dojde-li naopak ke zhoršení obtíží, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. O dlouhodobém používání přípravku musí vždy rozhodnout lékař.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Vysušte ránu tyčinkou s vatou nebo pořukáváním papírovým kapesníčkem.
2. Naneste pastu na čistou špičku prstu nebo tyčinku s vatou.
3. Naneste slabou vrstvu pasty na ránu, nevmasírovat.
4. Mokrým prstem nebo tyčinkou s navlhčenou vatou uhlad'te vrstvu pasty, při větších ranách je možno ústa vypláchnout vodou. Tím se vytvoří na sliznici lnoucí ochranný film.
5. Při otlačeninách způsobených protézou naneste pastu na očištěnou a suchou protézu. Aby se dosáhlo lepšího přilnutí protézy, doporučuje se před jejím nasazením vypláchnout ústa vodou.

Upozornění

Zdánlivě mírně suchá, krupičková forma pasty je znakem dobré přilnavosti a není příznakem ztráty kvality. Občas se může u uzávěru tuby objevit výtok oleje, toto však žádným způsobem nesnižuje kvalitu přípravku.

Tubu po použití pečlivě uzavřete!

Jestliže jste použil(a) více ústní pasty SOLCOSERYL, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ústní pastu SOLCOSERYL:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je při správném používání obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky nejsou dosud známe.

Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte s lékařem.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU SOLCOSERYL

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Datum poslední revize textu

7.10.2009