

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SOLCOSERYL oční gel

(Vitulinae sanguinis fractio deproteinata 8,3 mg/1g)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Solcoseryl oční gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solcoseryl oční gel používat
3. Jak se Solcoseryl oční gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Solcoseryl oční gel uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SOLCOSERYL OČNÍ GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Solcoseryl oční gel obsahuje dialyzát z telecí krve, který podporuje hojení.

Tento přípravek byl vyvinut speciálně k léčbě onemocnění a poranění rohovky a spojivky oka. Je určen pro dospělé, mladistvé i děti bez věkového omezení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SOLCOSERYL, OČNÍ GEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte Solcoseryl oční gel

- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Solcoseryl.

Zvláštní opatření při použití přípravku Solcoseryl oční gel je zapotřebí

- jestliže se u Vás někdy objevila alergická reakce na jakékoli oční kapky.

Přípravek Solcoseryl oční gel se může lepit na kontaktní čočky. Nepoužívejte je po celou dobu léčení tímto přípravkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo. Přesto však informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Porad'te se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, Váš lékař posoudí, zda je podávání přípravku pro Vás bezpečné.

Pokud kojíte, pečlivě dbejte na to, aby Vaše dítě nepřišlo do styku s přípravkem nebo kojení přerušete. Při styku s kojencem dodržujte pečlivě hygienické předpisy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřid'te dopravní prostředek po dobu nejméně 20 minut po aplikaci gelu, protože způsobuje rozmazané vidění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SOLCOSERYL OČNÍ GEL POUŽÍVÁ

Vždy použijte přípravek Solcoseryl oční gel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 1 kapka 3-4x denně do spojivkového vaku pod odtažené spodní víčko.

Před a po každém užití si pečlivě umyjte ruce, nedotýkejte se hrotu tuby. Po použití tubu pečlivě uzavřete. Po otevření používejte nejdéle 4 týdny. Po celou dobu léčby nepoužívejte kontaktní čočky.

Jestliže jste užil(a) použil(a) více přípravku Solcoseryl oční gel, než jste měl(a)

Dosud nebyly zaznamenány žádné případy předávkování přípravkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Solcoseryl oční gel

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Solcoseryl, oční gel

Řid'te se pokyny svého lékaře. Přípravek lze užívat i dlouhodobě.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Solcoseryl oční gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jen velmi vzácně, tj. u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, se vyskytlo pálení v místě aplikace. Bylo však přechodné a nevyžadovalo ukončení léčby.

Při dlouhodobém užívání existuje možnost vývoje alergie, projevující se jako překrvení, pálení, svědění nebo otok.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SOLCOSERYL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě.

Přípravek Solcoseryl oční gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabici. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření používejte nejdéle 4 týdny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Solcoseryl oční gel obsahuje

- Léčivou látkou je Vitulinae sanguinis fractio deproteinata 8,3 mg v 1 g gelu
- Pomocnými látkami jsou krystalizující sorbitol 70%, sodná sůl karmelosy, benzalkonium-chlorid, dinatrium-edetát, voda na injekci, hydroxid sodný.

Jak přípravek Solcoseryl oční gel vypadá a co obsahuje toto balení

Solcoseryl je bezbarvý nebo slabě nažloutlý homogenní gel tvořící kapky.

Velikost balení: 5g

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma s.r.o.

Praha

Česká republika

Výrobce

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Bad Homburg

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

5.10.2011